

## BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii:

**Păduchele din San José G1** (*Quadraspidiotus perniciosus*), Viermi fructe (*Laspeyresia spp.G1, t2*), **Monilioza sâmburoaselor** (*Monilinia spp.*), **Pătarea roșie a prunului** (*Polystigma r.*), **Ciuruirea frunzelor** (*Stigmia c.*).

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

**Prun**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **G1 (T1+T2) - Păduchele din San José**; numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **curativ pentru boli**.

Folosiiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Mospilan 20 SG = 0,25 – 0,3 kg/ha + Alcupral 50 PU = 2 kg/ha sau**
2. **Deltagri (Faster Delta) = 0,3 l/ha + Merpan 80 WDG ((Flo-Captan) = 2 kg/ha**

**Perioada optimă de tratament:** perioada 10 – 14 iunie.

### Alte recomandări:

- **Atenție! În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.**
- **Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.**
- La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalației de stropit;
- Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;

**Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării/fenofaza culturii | Tratamentul efectuat                       |                      |                               |              | Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recol tării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------|--|---|---|
|   |   |                                    | Agentul de dăunare:boli/dăunători/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața ha |  |   |   |
|   |   |                                    |  |                      |                               |              |  |   |   |

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013

Responsabil Prognoză și Avertizare,

Dr. Ing. Carmen Miroiu


